

胃镜

肠胃里的故事

结肠镜检查使用一根细而且柔软的内窥镜检查上消化道的内壁。内窥镜摄取的影像经视频处理器清晰显示在电视屏幕上，可以极大的方便专家进行诊察。特殊器械能够沿着内窥镜内送达到粘膜表面获取活检样品（微小的组织样品）也可用于切除息肉。所有样品均送至化验室化验。胃镜检查范围包括食管、胃和十二指肠（小肠开端）。

请注意：您的预约是做内窥镜检查。虽然您将获取到检查结果，但这不能视做为专科医生问诊。

胃镜检查的准备

您致电预约时，诊所工作人员会告诉您具体事项。通常，您需要在预约时间前六小时停止进食，两小时前停止摄入任何液体，包括清水。

您需要携带

- 与您检查相关的任何 X 射线照片。
- 您当前正在服用的药物清单。
- 医疗保险的预批准号码/信件（如有的话）。

因为会使用镇定剂，因此在您做完检查后需要有人开车将您送至家中。做好这一安排很重要，因为根据法律规定您此时不能自行驾驶车辆。为安全起见，您也不能步行回家。

抵达诊所

- 工作人员将向您提供更多有关胃镜检查的信息。
- 护士将询问您的健康和病史。

检查过程

- 您将在手术室内卧床。
- 我们将在您口腔后部进行局部麻醉。
- 注射镇静药物能帮助您放松。您可以选择是否注射镇静剂，但它能极大地帮助检查过程顺利进行。
- 胃镜检查是通过内窥镜检查食道、胃以及十二指肠的过程。

- 一般检查过程需要 15-30 分钟。您大概需要在诊所停留 1.5 - 2 小时。

食管

胃

十二指肠

安全和风险

检查用的胃镜在每个患者之间被完全清洁和消毒，以避免传播严重疾病（如艾滋病或肝炎）的风险。

在检查过程中存在牙齿损伤的小风险。

PTO

胃镜检查的严重并发症比较罕见，发生这些并发症的几率少于一万分之一。但是万一出现并发症，可能情况如下：

- 胃镜检查被认为是一个非常准确的检测。但也存在某项异常被漏检的风险。
- 对镇静剂反应。这是非常罕见的，但是患有严重心脏病或肺部疾病的人群需要特别注意。
- 穿孔（在胃肠道壁上造成孔洞）。
- 大出血。
- 如果发生这些严重并发症，您可能需要手术或输血。
- 任何检查都可能出现罕见的副作用。这种检查导致死亡的可能极为罕见。
- 如果您想了解更多详情，请在手术前与您的内窥镜医师讨论。

• 如果您在胃镜检查后数小时或几天内出现任何以下症状，请马上联系

如果您在肠镜检查后数小时或几天内出现任何以下症状，请您马上联系奥克兰肠胃镜中心，您的内窥镜专家或您的家庭医生：剧烈腹痛、黑色焦油状大便、持续出血、发烧或其他让您担忧的症状

第 29 章所涉及 药物

- 1981 年的《药物法》允许授权的医疗人员为其病人的治疗开具处方、使用药物，或安排使用药物。药物及其使用有可能不被批准。本法令也允许供应商向注册医生出售或供应未经批准的药物，但是需要通知卫生部的理事长。
- 根据 1981 年《药物法》第 29 章，医生可以为指定患者的特殊治疗获取非注册药物。您在奥克兰肠胃镜中心检查和治疗期间，我们可能会为您使用在第 29 章提及的药物。此时，奥克兰肠胃镜中心需要向第三方提供您的相关信息。因此，作为《药品法》的要求之一，您需要同意接受第 29 章所规定药物的管理要求，并同意 Medsafe 共享您的个人信息，并将这些信息存放在他们的数据库里。

胃镜后

检查结束后，医护人员会推您到恢复室休息，等待镇静剂药效结束。

在您醒来后，您的专家将与您讨论您的检查结果。有时您可能不能清楚地记住专家和您讨论的事项，甚至记不住专家和您说过话（由于镇静剂的原因），因此我们会给您一份书面总结供您参考。详细的报告将会由您的专家发送给您的家庭医生或转诊医生。

在您离开诊所之前，将向您提供小吃。

大多数人能在第二天恢复正常活动。

如果有活组织检查，化验结果将寄给您的家庭医生或转诊医生和奥克兰肠胃镜中心的专科医生（5天内可以收到）。

奥克兰肠胃镜中心于1997年4月1日开放，是一个专为内窥镜检查目的所设置的诊所。

我们的团队由内镜专科医生（外科医生和胃镜病专家）、受过专门训练的注册护士和行政人员组成，提供高质量的护理是我们的首要任务。

如果您有任何疑问或需要更多信息，请随时与我们联系。

我们希望听到您宝贵的反馈意见。

如果您有任何问题希望与我们进一步沟通，请随时与我院经理联系。

148 Gillies Avenue Epsom

奥克兰 1023

新西兰

电话：09 623 2020

0800 endoscopy

0800 363 672

传真：09 623 1010

网页：www.endoscopyak.co.nz

电子邮件：admin@endoscopyak.co.nz